AWI0115

Closed goat serum
封闭山羊血清

产品介绍

封闭山羊血清是目前广泛使用的免疫学试验中的封闭及保护试剂。使用本血清封闭可预先饱和组织切片对蛋白物质的物理吸附位点，从而大大减少组织对检测抗体的非特异性吸附。本封闭液采用优质正常山羊血清为原料，加入稳定剂和蛋白保护剂，可有效的的封闭组织上能与抗体非特异结合的位点，从而减少IHC实验的非特异染色，显著的降低背景。

产品规格

名称	货号	规格
封闭山羊血清	AWI0115-10ml	10ml

保存条件

-20℃

使用方法

1、 常规处理欲检测的石蜡或冰冻组织切片或细胞爬片等样本。
2、 滴加适量内源性过氧化物酶封闭液，室温孵育10分钟， PBS充分淋洗。
3、 滴加适量封闭用正常山羊血清工作液 (免疫组化封闭液)， 室温孵育10分钟，甩干。
4、 进行后续的一抗孵育等IHC染色步骤。

注意事项

1、 如所用的一抗为山羊来源的(Goat anti-)，请避免使用该封闭液，否则可能造成更多非特异着色。
2、 以每张切片加入1滴(约50 pl)计算， 10ml可做200张切片。
3、 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳使用量。
4、 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
5、 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。